Uniwersytet Wrocławski

Repozytorium

Plik pochodzi z repozytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Structure, dynamics and catalytic activity of palladium(II) complexes with imidazole ligands.

Autorzy

Michał S. Szulmanowicz

Wojciech Zawartka

Andrzej Gniewek

Anna M. Trzeciak

Rok wydania

2010

Czasopismo

Inorganica Chimica Acta

Numer woluminu

363

Strony

4346-4354

DOI

10.1016/j.ica.2010.08.037

Kolekcja

Naukowa

Język

Angielski

Typ publikacji

Artykuł

Streszczenie

Several palladium complexes of the type $[Pd(im)_2Cl_2]$, $[Pd(im)_3Cl]Cl$, and $[Pd(im)_4]Cl_2$ (im = imidazole **1**, 1-methylimidazole **2**, 1,2-dimethylimidazole **3**, 1-butylimidazole **4**, **4a**, 1-phenylimidazole **6,** 1-phenylimidazoline **7**, and 1-methylimidazoline **8**) were prepared and structurally characterized. The square planar structure of two new complexes with the composition $[Pd(im)_4]Cl_2$ (**2b**, **4b**) was confirmed by X-ray analysis. In solution, exchange of imidazole ligands leading to heteroleptic products was evidenced by ESI-MS studies. Two bis-ligated complexes, bearing 1-methylimidazole (**2a**) and 1-propoxymethylimidazole (**5**) ligands, were obtained in the reaction of palladium with imidazoles formed by deprotection of one nitrogen atom in the respective imidazolium halides. Catalytic Suzuki–Miyaura reactions were carried out using the obtained palladium complexes in isopropanol–water solution. High yields of the cross-coupling products were obtained at 40 and 60 °C when 2-bromotoluene, 4-bromotoluene, and 4-bromoanizole were used as substrates.

Słowa kluczowe

palladium, imidazole, imidazoline, ESI-MS studies, Suzuki–Miyaura reaction

Adres publiczny

https://doi.org/10.1016/j.ica.2010.08.037

Strona internetowa wydawcy

http://www.elsevier.com

Plik został wygenerowany dnia 2026-11-03 15:52:05

Adres w repozytorium https://old.chem.uni.wroc.pl/pl/repozytorium/-DkYY0c.