Uniwersytet Wrocławski

Repozytorium

Plik pochodzi z repozytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Proton NMR studies of palladium (II) complex conformation with glycyl-L-tyrosine in aqueous solution.

Autorzy

Henryk Kozłowski

Rok wydania

1977

Czasopismo

Chemical Physics Letters

Numer woluminu

47

Strony

452-456

DOI

10.1016/0009-2614(77)85014-8

Kolekcja

Naukowa

Język

Angielski

Typ publikacji

Artykuł

Streszczenie

The conformation for 1:1 and 1:2 Pd(II)-Gly-Tyr complexes has been established with the ^{1}H NMR method. A correlation between $\Delta\nu_{AB}$ of the AB glycine proton spectrum and the side-chain bulk of the bidentate Gly-Aspa, Gly-Glua and Gly-Tyr complexes with Pd(II) has been found. This relation corresponds to a lowering of the symmetry of the EPR spectra in the same series of dipeptide complexes with Cu(II). Both results suggest that the symmetry lowering of the glycine NMR spectra and the Cu(II) EPR spectra are of the same origin, and that the influence of the side-chains is through the amine nitrogen on the metal ion and the glycine protons.

Adres publiczny

https://doi.org/10.1016/0009-2614(77)85014-8

Strona internetowa wydawcy

http://www.elsevier.com

Plik został wygenerowany dnia 2026-11-09 03:01:31

Adres w repozytorium https://old.chem.uni.wroc.pl/pl/repozytorium/AA5MjFz.