

Novel pyrazolate-based copper(II) [2x2] grid complexes: synthesis, structure and properties.

Autorzy

Sergey O. Malinkin

Yurii S. Moroz

Larysa V. Penkova

Matti Haukka

Agnieszka Szebesczyk

Elżbieta Gumienna-Kontecka

Vadim A. Pavlenko

Ebbe Nordlander

Franc Meyer

Igor O. Fritsky

Rok wydania

2012

Czasopismo

Inorganica Chimica Acta

Numer woluminu

392

Strony

322-330

DOI

10.1016/j.ica.2012.03.021

Kolekcja

Naukowa

Język

Angielski

Streszczenie

5-Acetyl-substituted pyrazole-3-carboxylic acid ($H_2 L$) forms [2x2] grid-like tetranuclear Cu(II) complexes with four five-coordinated copper(II) ions bridged by pyrazolate groups. Despite a significant dissociation of $[Cu_4 L_4 (H_2 O)_4] \cdot 4H_2 O$ (1) in aqueous solution¹, it was possible to substitute the coordinated water molecules by pyridine ligands or azide anions. The resulting tetranuclear complexes $[Cu_4 L_4 Py_4] \cdot 2H_2 O$ (2) and $Na_4 [Cu_4 L_4 (N_3)_4] \cdot 7MeOH$ (3) were isolated and studied by X-ray diffraction analysis. In 2 and 3 the azide anions or pyridine molecules complete the distorted square-pyramidal coordination of each copper(II) center. Magnetic susceptibilities of the obtained compounds have been measured by SQUID techniques. Simulation of the data using a Heisenberg spin Hamiltonian approach showed that the bridges between the metals mediate weak intramolecular antiferromagnetic coupling (J in the range -13.3 to $-17.1 cm^{-1}$) and lead to a singlet ground state in all cases.

Słowa kluczowe

Pyrazole ligands, copper(II), Grid complexes, magnetic properties

Adres publiczny

[http://dx.doi.org/ 10.1016/j.ica.2012.03.021](http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2012.03.021)

Strona internetowa wydawcy

<http://www.elsevier.com>

Typ publikacji

Artykuł

Plik został wygenerowany dnia 2026-06-17 01:59:46

Adres w repozytorium <https://old.chem.uni.wroc.pl/pl/repozytorium/TCoTYcH>.