

$\mu$ -oxalato-1 $\kappa^2$ O,O':2 $\kappa^2$ O",O'''-bis(chloro[[1-(2-pyridyl- $\kappa$ N)ethylidene]hydrazine- $\kappa$ N}copper(II)).

Autorzy

S. V. Tomyń

Elżbieta Gumienna-Kontecka

Igor O. Fritsky

Turganbay S. Iskenderov

Jolanta Świątek-Kozłowska

Rok wydania

2007

Czasopismo

Acta Crystallographica

Section E: Structure Reports

Online

Numer woluminu

E63

Strony

m438-m440

DOI

10.1107/S1600536807000098

Kolekcja

Naukowa

Język

Angielski

Typ publikacji

Artykuł

Streszczenie

The title compound, [Cu<sub>2</sub>(C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>)Cl<sub>2</sub>(C<sub>7</sub>H<sub>9</sub>N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>], contains neutral molecules of a centrosymmetric dinuclear oxalate-bridged copper(II) complex, in which the oxalate ligand is coordinated in a bis-bidentate bridging mode to the Cu atoms. Each Cu atom has a distorted square-pyramidal environment, being coordinated by two N atoms of the [1-(pyridin-2-yl)ethylidene]hydrazine ligand, two O atoms of the doubly deprotonated oxalate anion and one Cl<sup>-</sup> anion.

Adres publiczny<https://doi.org/10.1107/S1600536807000098>